



EDWARDS
ORTHOPEDICS

Advanced Orthopedic Surgery, Close to Home.

Dr. Chad Edwards. Orthopedic Surgeon

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

Artroplastia Total de Rodilla

Las instrucciones de rehabilitación o fisioterapia, cuando sean necesarias, se entregan por separado.

Cuidado de la Incisión y el Vendaje

- Mantenga el vendaje Ace colocado durante los primeros dos días después de la cirugía y retírelo el día posoperatorio 3.
- Debajo del vendaje Ace hay un vendaje Aquacel. Es impermeable, por lo que puede ducharse a partir del día posoperatorio 3 después de retirar el vendaje Ace.
- No sumerja la incisión en agua hasta que se le autorice.
- Retire el vendaje Aquacel 1 semana después de la cirugía. Debajo hay una malla de Dermabond que debe permanecer en su lugar.
- Retire el Aquacel con cuidado para no desprender la malla de Dermabond. Si la malla se desprende accidentalmente, continúe con el plan según las indicaciones.
- Llame al consultorio si el Aquacel se satura, empieza a gotear, se despegue de manera importante o pierde el sello.

Control del Dolor - Objetivo: Minimizar los Opioides

- **Acetaminofén (Tylenol):** Tome 1,000 mg (dos tabletas Extra Strength de 500 mg) tres veces al día, a menos que se le indique lo contrario.
- **Medicamento antiinflamatorio:** A menos que se le haya recetado Celebrex u otro antiinflamatorio, tome ibuprofeno 800 mg tres veces al día con alimentos.
- **No combine AINEs/NSAIDs.** No tome ibuprofeno junto con Celebrex, meloxicam, naproxeno, diclofenaco u otro AINE/NSAID. Si le han indicado que evite los AINEs, no tome ibuprofeno a menos que se le indique específicamente.
- **Relajante muscular:** En ocasiones se puede recetar Flexeril (ciclobenzaprina) para espasmos musculares. Tómelo solamente según las indicaciones. Puede causar somnolencia.
- **Oxicodona / Percocet:** Úselo solamente si el dolor continúa siendo insoportable a pesar de Tylenol y su medicamento antiinflamatorio. Use la menor cantidad posible. El objetivo es evitar los opioides siempre que sea posible.
- **Advertencia importante sobre Tylenol:** No tome otros medicamentos que contengan acetaminofén. Percocet contiene acetaminofén y debe contarse dentro de su cantidad diaria total.
- **Alcohol y conducción:** No beba alcohol ni conduzca mientras esté tomando oxicodona, Percocet, Flexeril o cualquier medicamento que cause sueño o afecte su juicio.
- **Anticoagulante:** Si se le receta un anticoagulante, tómelo exactamente según las indicaciones.

Prevención de Coágulos de Sangre

- **Aspirina 81 mg dos veces al día:** Tómela para prevenir coágulos de sangre, a menos que ya tome otro anticoagulante o se le haya indicado lo contrario.
- Si se le receta otro anticoagulante, tómelo exactamente según las indicaciones.

Actividad y Movilidad

- Comience a caminar y a realizar movimientos ligeros tan pronto como pueda.
- Use un andador o bastón según las indicaciones y tome precauciones para evitar caídas.
- Evite actividades de alto impacto, giros repentinos y actividades con riesgo importante de caídas hasta que se le autorice aumentar la actividad.
- No conduzca hasta que pueda controlar el vehículo con seguridad y se le autorice. Nunca conduzca mientras esté tomando opioides, Flexeril u otro medicamento sedante.
- Siga las instrucciones de fisioterapia y rehabilitación que se entregan por separado.

Nutrición

- Manténgase bien hidratado y consuma una dieta saludable y rica en proteínas. Puede usar batidos de proteína como Ensure si necesita proteína adicional.

Seguimiento

- Se programará una cita de seguimiento para controlar su recuperación.
- Llame al consultorio si tiene preguntas o inquietudes antes de su cita de seguimiento.

Llame al Consultorio por Cualquier Otra Inquietud

- Aumento del enrojecimiento, hinchazón, calor o drenaje de la incisión.
- Fiebre o escalofríos.
- Dolor intenso o que empeora y no mejora como se esperaba.
- Hinchazón persistente o dolor en la pantorrilla.
- Problemas con el vendaje, como saturación, goteo o pérdida del sello.

LLAME AL 911 O VAYA A LA SALA DE EMERGENCIAS

Por cualquier problema de emergencia. No use el teléfono del consultorio ni la línea de texto posoperatoria urgente para una emergencia.