



EDWARDS
ORTHOPEDICS

Advanced Orthopedic Surgery, Close to Home.

Dr. Chad Edwards. Orthopedic Surgeon

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

Fijación del Radio Distal

Las instrucciones de rehabilitación o fisioterapia, cuando sean necesarias, se entregan por separado.

Cuidado de la Incisión y la Férula

- El sitio quirúrgico estará cubierto con una férula inmediatamente después de la cirugía.
- Mantenga la férula limpia y seca hasta su cita de seguimiento. No la retire a menos que se le indique específicamente.
- Si la férula se moja, se daña o se siente demasiado apretada y dolorosa, comuníquese con el consultorio.

Control del Dolor - Objetivo: Minimizar los Opioides

- **Acetaminofén (Tylenol):** Tome 1,000 mg (dos tabletas Extra Strength de 500 mg) tres veces al día, a menos que se le indique lo contrario.
- **Medicamento antiinflamatorio:** A menos que se le haya recetado Celebrex u otro antiinflamatorio, tome ibuprofeno 800 mg tres veces al día con alimentos.
- **No combine AINEs/NSAIDs.** No tome ibuprofeno junto con Celebrex, meloxicam, naproxeno, diclofenaco u otro AINE/NSAID. Si le han indicado que evite los AINEs, no tome ibuprofeno a menos que se le indique específicamente.
- **Relajante muscular:** En ocasiones se puede recetar Flexeril (ciclobenzaprina) para espasmos musculares. Tómelo solamente según las indicaciones. Puede causar somnolencia.
- **Oxicodona / Percocet:** Úselo solamente si el dolor continúa siendo insoportable a pesar de Tylenol y su medicamento antiinflamatorio. Use la menor cantidad posible. El objetivo es evitar los opioides siempre que sea posible.
- **Advertencia importante sobre Tylenol:** No tome otros medicamentos que contengan acetaminofén. Percocet contiene acetaminofén y debe contarse dentro de su cantidad diaria total.
- **Alcohol y conducción:** No beba alcohol ni conduzca mientras esté tomando oxicodona, Percocet, Flexeril o cualquier medicamento que cause sueño o afecte su juicio.
- **Anticoagulante:** Si se le receta un anticoagulante, tómelo exactamente según las indicaciones.

Actividad y Restricciones

- A menos que se le indique lo contrario, deje que el dolor sea su guía.
- No levante más de 2 libras con el brazo afectado.
- Mueva los dedos con regularidad y use la mano suavemente para actividades sencillas según lo tolere.
- No empuje, jale, apoye peso sobre la mano o la muñeca, ni use la mano afectada para levantarse de una silla hasta que se le autorice.
- Mantenga la mano elevada tanto como sea práctico durante las primeras 24-48 horas para ayudar a disminuir la hinchazón.

Seguimiento

- Se programará una cita de seguimiento para controlar su recuperación.
- Llame al consultorio si tiene preguntas o inquietudes antes de su cita de seguimiento.

Llame al Consultorio por Cualquier Otra Inquietud

- Aumento del enrojecimiento, hinchazón, calor o drenaje de la incisión.
- Fiebre o escalofríos.
- Dolor intenso o que empeora y no mejora como se esperaba.
- Entumecimiento u hormigueo nuevo o en aumento en los dedos.
- Dificultad para mover los dedos, o dedos que se ponen pálidos, azules o fríos.
- Aumento de la hinchazón o dolor en la mano o los dedos que no mejora con elevación y medicamentos.

LLAME AL 911 O VAYA A LA SALA DE EMERGENCIAS

Por cualquier problema de emergencia. No use el teléfono del consultorio ni la línea de texto posoperatoria urgente para una emergencia.